放置は危険！
生活習慣病

脂肪肝の重症化

を食い止めよう

監修 順天堂大学大学院医学研究科
先端予防医学・健康情報学講座
特任教授 福田 洋

脂肪肝が進行すると…？

脂肪肝は糖尿病や慢性腎臓病などを悪化させ、脳梗塞や心筋梗塞の発症リスクを高めることが知られています。さらに、肝硬変の状態まで進行してしまうと、肝がんや食道・胃静脈瘤、肝性脳症、腹水といった合併症を引き起こします。

脂肪肝とは名前の通り、肝臓に脂肪がついた状態のこと。「お酒を飲む人だけが気をつければいい」「脂肪肝ぐらい放置しても大丈夫」と思っていないですか。実は脂肪肝は飲酒習慣がなくても、食べすぎや運動不足、栄養バランスの偏り等によって起こることがあります。また、脂肪肝を放置すると自覚症状がないまま、肝硬変や肝がんなどの重篤な病気を引き起こすことも。健診で肝機能の数値が悪かった人、脂肪肝と指摘されたことのある人は注意が必要です。

肝機能の数値の目安は？

目標	基準値	保健指導判定値※1	受診勧奨判定値※2
AST (GOT)	30U/l以下	31~50U/l	51U/l~
ALT (GPT)	30U/l以下	31~50U/l	51U/l~
γ-GT (γ-GTP)	50U/l以下	51~100U/l	101U/l~

※1 生活習慣の改善が必要な数値です。

※2 医療機関への受診が必要な数値です。

お酒を飲まない人の脂肪肝 (NASH) って？

お酒を飲まない人の脂肪肝 (NASH) が増えています。このタイプは食べすぎなどによって肝臓に脂肪がたまるのが原因。アルコール性脂肪肝と同様、肝臓に炎症を起こし、肝硬変を引き起こすリスクがあります。お酒は飲まないからと甘く見ることは禁物です。

重症化を防ぐためには？

脂肪肝の改善は…

でき…ます…よ

1 肥満を改善する

脂肪肝になる最大の原因は肥満。そのため、**太っている人は食事と運動による減量が必要**です。その一方、太っていない場合でも安心はできません。極端な食事制限によるダイエットをしたことのある人は、「低栄養性脂肪肝」という脂肪肝になることがあります。

お酒 アルコールは肝臓に中性脂肪を蓄積させるため、**医師の指示に従い節酒あるいは禁酒**を行う。

食事 糖質を多く含む飲みもの、脂肪分を多く含む乳製品や脂っこい料理を控える。**とくに果物の食べすぎは、中性脂肪のもととなる果糖の過剰摂取につながるので注意**。緑黄色野菜や食物繊維も忘れずに。

運動 週に3回以上、軽く汗ばむ程度の運動を20分以上行う。有酸素運動のほかに、スクワットや腹筋などの**筋トレを取り入れるのも効果的**。

※7%の減量で肝臓の脂肪化、炎症を改善し、10%以上で肝臓の繊維化 (肝硬変) も改善するという報告もあります。

出典：NAFLD/NASH診療ガイドライン2020, 南江堂, 2020

2 生活習慣病を改善する

糖尿病や脂質異常症、高血圧などの人は、その治療を継続して行うことも大切です。**生活習慣病への治療は、脂肪肝の改善にもつながります。**